

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka didapatkan kesimpulan:

1. Laki – laki merupakan populasi terbanyak pasien stroke hemoragik pada RSUD CAM.
2. Kelompok usia terbanyak pada pasien stroke hemoragik di RSUD adalah 51 – 80.
3. Etiologi dan Faktor risiko terbanyak dialami oleh pasien stroke hemoragik di RSUD CAM adalah hipertensi.
4. Hasil CT – Scan terbanyak pada pasien stroke hemoragik di RSUD CAM adalah dengan volume perdarahan 21 – 40 cc.
5. Rentang NIHSS sebelum melakukan terapi pada pasien stroke hemoragik di RSUD CAM adalah 5 – 14 (stroke sedang).
6. Rentang NIHSS setelah melakukan terapi pada pasien stroke hemoragik di RSUD CAM adalah 5 – 14 (stroke sedang).
7. Rentang GCS sebelum melakukan terapi pada pasien stroke hemoragik di RSUD CAM adalah 13 – 15.
8. Rentang GCS setelah melakukan terapi pada pasien stroke hemoragik di RSUD CAM adalah 13 – 15.
9. Berdasarkan persentasi dari rentang usia 20 – 50 tahun yang melakukan terapi operatif maupun konservatif, didapatkan terapi operatif lebih baik dibandingkan konservatif dengan perbandingan persentase yaitu 29,4% dengan 18,6%
10. Berdasarkan persentasi dari rentang usia 20 – 50 tahun yang melakukan terapi operatif maupun konservatif, didapatkan terapi konservatif jauh lebih baik dibandingkan operatif dengan perbandingan persentase yaitu 79,7% dengan 64,7%

11. Berdasarkan persentasi dari rentang usia 80 tahun ke atas yang melakukan terapi operatif maupun konservatif, didapatkan terapi operatif jauh lebih baik dibandingkan konservatif dengan perbandingan persentase yaitu 79,7% dengan 64,7%

5.2. Saran

Dalam penelitian ini, diharapkan mendapatkan sampel penelitian yang seimbang, sehingga dapat membandingkan secara rinci, dan juga penelitian ini dapat menjadi acuan untuk penelitian selanjutnya.

